

KALK HUM

Dirvožemio gerinimo ir kalkinimo trąšos

Cheminė sudėtis
CaO 50÷55(Paskaičiuota į formą CaCO ₃ 95÷99 %)
Ca 36 ÷40
MgO > 1
Fe ₂ O ₃ > 1
K ₂ O > 0,46
Na ₂ O > 0,17
SiO ₂ > 5,3
P ₂ O ₅ > 0,07

Kita informacija:

Trąšų sudėtyje yra 0,4 % koncentruotų, Amerikos Leonarditų kilmės huminių rūgščių, kas atitinka 20 litrų vienoje tonoje skysto Humistar. Tai padeda maisto medžiagų įsisilavinimui iš dirvos, geriau vystosi augalų šaknys, gerėja dirvos struktūra, teigiamai įtakoja dirvos mikroorganizmų veikla.

Granulės dydis / frakcijos: 2-5mm

Pakuotės dydis: 500+-5 kg

Tręšimo būdas ir normos:

Rekomenduojamos vidutinės tręšimo normos	kg/ha
Visi augalai	1000
Palaikomoji tręšimo norma, kuomet tręšiama kasmet	500

Rekomenduojama tręšti atsižvelgiant į dirvos tyrimų duomenis.

Trąšos išberiamos pakrikai prieš sėją, dirvos dirbimo metu. Galima kalkinti tiek rudenį, tiek pavasarį.

Sandėliavimo ir naudojimo taisyklės:

-Sandėliuokite maišus uždengtus, kad apsaugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. -Laikykite atokiau nuo šilumos ir liepsnos šaltinių, lengvai užsidegančių medžiagų ir chemikalų. -Užtikrinkite lengvą priejimą. -Laikykite trąšas, maišus ir uždangalus vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Pritaikymas ir naudojimas:

Pirkėjo atsakomybė yra užtikrinti teisingą ir atsakingą produkto pritaikymą.

Naudoti esant tik pripažintame būtinumui. Neviršyti atitinkamų koncentracijos verčių.

Svarbu:

S2 Saugoti nuo vaikų.

S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S37 Mūvėti tinkamas pirštines.

S39 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Pagaminimo data:

Tinkamai sandėliuojant galiojimo laikas neribojamas.

Gamintojas:

UAB "Mortar Akmenė"

Statybininkų g. 69,

Venta Akmenės rajonas

Pardavėjas:

UAB "Baltic Agro"

Perkūnkiemio 2, Vilnius

Tel +370 5 270 1187